

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 16-6-69 941405

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 10 fois par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Regisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. UDON 340512 K.

25 F.

Bulletin n° 105 - JUIN 1969

10 JUIN 1969

## VIGNE

MILDIOU : Les conditions climatiques de la semaine dernière ont retardé l'apparition des taches prévue dès le 1er Juin. La pousse de la vigne s'est trouvée également ralentie. Ce n'est qu'à partir du 5 Juin que des taches sont apparues. Les repiquages sont faibles.

Effectuer un traitement soigné - (bien mouiller les grappes) - avant le 15 Juin.

OIDIUM : Ajouter un produit anti-oïdium à la bouillie anti-milou. Les attaques d'oïdium peuvent se développer à la suite du relèvement des températures.

VERS DE LA GRAPPE (COCHYLIS - EUDENIS) : Bien que le vol des papillons ait été fortement perturbé, la semaine dernière, nous conseillons un traitement à l'aide d'un produit de type curatif (consulter la liste des pesticides envoyée en début de campagne).

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Les projections d'ascospores sont terminées mais les sorties de taches étant très importantes, il convient de poursuivre la protection.

CARPOCAPSE DES POMMES ET POIRES : Les conditions climatiques ont été défavorables et les pontes déposées peu nombreuses, il est trop tôt pour traiter.

RAPPEL : Oïdium du pommier, pucerons, psylles du poirier.

OIDIUM AMERICAIN DU GROSEILLIER A NAQUEREAU SUR CASSISSIER : Renouveler le traitement conseillé dans notre bulletin du 28 Mai.

## CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE L'OIGNON : Renouveler le traitement.

SEPTORIOSE DU CELERI : Il est conseillé d'effectuer un traitement. Le renouvellement de celui-ci se fera tous les 10 - 15 jours, en fonction de la pluviométrie naturelle ou artificielle et du développement de la végétation.

7.268

## POMMES DE TERRE

MILDIOU : Les conditions climatiques étant très favorables au développement de la maladie, effectuer un premier traitement sur toutes les variétés hâtives où la végétation atteint 30 à 40 cm et où la récolte n'est pas prévue avant une quinzaine de jours.

### CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DU MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Deux primes seront attribuées à la première et à la seconde personnes de chaque région qui nous feront parvenir des feuilles de pommes de terre atteintes de mildiou.

L'échantillon, placé entre deux feuilles de papier buvard humide, devra être adressé au SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX, 21, route de Seurre - 21 BEAUNE, et accompagné des renseignements suivants :

Nom ..... Prénom .....

Adresse précise .....

Date de la découverte .....Variété .....

Date de la plantation .....

Importance et situation du foyer .....

66

## H O U B L O N S

### MILDIOU - PUCERONS :

Renouveler les traitements conseillés dans la note du 29 Mai.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles :

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur  
de la Protection des Végétaux - Circonscription  
phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE" :

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche-Comté"  
Le Directeur-Gérant :

L. BOUYX.